

SCOLTI OXI Zn

SCOLTI OXI Zn

SCOLTI OXI Zn

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	TOPRAKTAN UYGULAMA
Bağ	İlk uygulama yapraklar döküldüğünde, diğer uygulama gözler uyanmadan önce, bir sonraki uygulamaya yapraklı dönemde 15'er gün ara ile devam edilir.	400 - 500 ml
Zeytin	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	400 - 500 ml
Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Birinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde Gerekli olduğu dönemde 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	400 - 500 ml
Elma, Armut	İlk uygulama gözler uyanmadan önce, diğer uygulama fare kulağı döneminde bir sonraki uygulama pembe tomurcuk döneminde yapılır. Yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	400 - 500 ml
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	400 - 500 ml
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hıyar, Kavun, Çilek Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	400 - 500 ml
Yonca, Banya, Bakla,	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	150 - 200 ml
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarımsak	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	400 - 500 ml
Pamuk, Tütün, Mısır, Yerfıstığı, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	400 - 500 ml
Kesme Çiçekçilik	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	400 - 500 ml
Buğday, Arpa, Çeltik Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	400 - 500 ml

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

EC FERTİLİZER

**Bakır (Cu-Oksiklorür) ve Çinko (Zn-Oksit)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı**

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	w/w
Toplam BAKIR (Cu)	% 20
Toplam ÇİNKO (Zn)	% 7



Cu

Zn

UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz. • Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tıbbi yardım alınız. • Yutulması ve teneis edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. • Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız. • Yiyecek, içecek ve yerlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve ilaçlarla karıştırılacağı zaman fiziksel uyumluluk için kavanoz testi yapılmalıdır. Bununla birlikte geniş bir alana uygulamadan önce küçük bir alanda denemesi önerilir.

DEPOLAMA DURUMU :

SCOLTI-OXI ZN orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişiklik olmaz. Depolama sıcaklığı 0/40 C'dir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen doktora gidiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA:

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Falez
Apt. NO:2 Daire:1 ANTALYA Tel: 0242 999 90 19
www.semica.com.tr

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.
Şarj Numarası :
Lisans No : 1677
Tescil No : 2022TK3338
Net Miktarı :

Hacim : 1 lt 5 lt
Net : 1,32 Kg 6,6 Kg