

SUMİ BORDEX

| BİTKİ | YAPRAKTAN | DAMLAMADAN |
|--|--------------------------|-----------------|
| Bağ | 100 L suda 250-300 ml | 600 - 750 ml/da |
| Zeytin | 100 L suda 300-400 ml | 600 - 750 ml/da |
| Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Kivi, Ceviz, Nar v.b.) | 100 L suda 300-400 ml | 600 - 750 ml/da |
| Elma, Armut | 100 L suda 300-400 ml | 600 - 750 ml/da |
| Narenciye, Avakado, Yeni Dünya | 100 L suda 200-250 ml | 600 - 750 ml/da |
| Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hiyar, Kavun, Çilek Karpuz, Kabak v.b.) | 100 L suda 250-300 ml | 600 - 750 ml/da |
| Yonca, Bamya, Bakla Fasulye, Bezelye Barbunya | 100 L suda 250-300 ml | ----- |
| Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarımsak | 100 L suda 250-300 ml | 600 - 750 ml/da |
| Pamuk, Mercimek, Nohut v.b. | 100 L suda 250-300 ml | 600 - 750 ml/da |
| Kesme Çiçekçilik Tütün, Mısır, Yerfıstığı | 100 L suda 250-300 ml | 600 - 750 ml/da |
| Buğday, Arpa, Çeltik | 100 L suda 250-300 ml | 600 - 750 ml/da |

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketin aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

SUMİ BORDEX

EC FERTİLİZER

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | w/w |
|-------------------------|-------|
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,5 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 3 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 2 |



semica

SUMİ BORDEX

UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz. • Tıbbi yardım alınız.
- Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Yutulması ve teneüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. • Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞILIRLIK :

Kuvvetli asidik, alkali, yağlar ve kükürtlü bileşiklerle karıştırmayınız. Geniş alan uygulamalarında mutlaka ön karışım yaprak denemesi yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU : SUMİ BORDEX orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı taktirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişiklik olmaz. Depolama sıcaklığı 0° C - 40° C'dir.

FİRMA BEYANI : Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmaması orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA :

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. Falez Apt.

No:2 D:1 Muratpaşa/ANTALYA

Tel : 0242 999 90 19

www.semica.com.tr

Üretim Tarihi : | Bu bilgiler kapağın üzerindedir.

Şarj Numarası : |

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

Lisans No : 1677

Tescil No : 2022TK5375

Net Miktarı :

Hacim : 1 L 5 L 10 L

Net : 1,04 Kg 5,2 Kg 10,4 Kg