

SUMİFER

SUMİFER

SUMİFER

Bor (B) ve Demir (Fe-Sülfat) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLAMADAN
Bağ	İlk uygulama yapraklar döküldüğünde, diğer uygulama gözler uyanmadan önce, bir sonraki uygulamaya yapraklı dönemde 15'er gün ara ile devam edilir.	250 - 350 ml	Dekara 1,5 - 2 L
Zeytin	Gerekliliği olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	250 - 350 ml	Dekara 1,5 - 2 L
Meyve Ağaçları (Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Antep Fıstığı, Badem, Fındık Kivi, Ceviz, Nar v.b.)	Birinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde Gerektiğinde yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	250 - 350 ml	Dekara 1,5 - 2 L
Elma, Armut	İlk uygulama gözler uyanmadan önce, diğer uygulama fare kulağı döneminde bir sonraki uygulamaya pembe tomuruk döneminde yapılır. Yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	250 - 350 ml	Dekara 1,5 - 2 L
Narenciye, Avakado, Yeni Dünya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	250 - 350 ml	Dekara 1,5 - 2 L
Sera ve Açık alan sebze yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Hıyar, Kavun, Çilek Karpuz, Kabak v.b.)	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	250 - 350 ml	Dekara 1,5 - 2 L
Yonca, Bamya, Bakla, Fasulye, Bezelye, Barbunya	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	250 - 350 ml	
Şeker pancarı, Havuç, Turp, Patates, Soğan, Sarımsak	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	250 - 350 ml	Dekara 1,5 - 2 L
Pamuk, Tütün, Mısır, Yerfıstığı, Mercimek, Nohut v.b.	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	250 - 350 ml	Dekara 1,5 - 2 L
Kesme Çiçeklilik	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	250 - 350 ml	Dekara 1,5 - 2 L
Buğday, Arpa, Çeltik	Gerekli olduğu durumlarda 2-3 uygulama yapılır.	250 - 350 ml	Dekara 1,5 - 2 L

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

w/w

Suda Çözünür DEMİR

% 2

Suda Çözünür BOR

% 0,5



semica

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ!!

UYARILAR :

- Asla uygun doz oranını aşmayınız. • Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz. • Göze ve deriye temas halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- Tıbbi yardım alınız. • Yutulması ve tenesis edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. • Korumayı eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulamaya çalışmayınız. • Yiyecek, içecek ve yerlerden uzak tutunuz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KARİŞİBİLİRLİK :

Diğer gübre ve ilaçlarla karıştırılacağı zaman fiziksel uyumluluk için kavanoz testi yapılmalıdır. Bununla birlikte geniş bir alana uygulamadan önce küçük bir alanda denemesi önerilir.

DEPOLAMA DURUMU :

SUMİFER orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fizik, kimyevi ve biyolojik özelliklerden en az 3 yıl değişiklik olmaz. Depolama sıcaklığı 0/40 C'dir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulduğunda zararlı olduğu için, bol su ve süt içiniz. Hemen doktora gidiniz. Antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI:

Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA:

semica

Semica Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Falez

Apt. NO:2 Daire:1 ANTALYA Tel: 0242 999 90 19

www.semica.com.tr

Üretim Tarihi : | Bu bilgiler ambalajın üzerindedir.
Şarj Numarası :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıl
Lisans No : 1677
Tescil No : 2022TK3742
Net Miktarı :

Hacim : 1 lt
Net : 1,34 Kg
5 lt
6,7 Kg

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.